

Số: /TB-UBND

Ích Hậu, ngày tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v phòng trừ sâu bệnh cuối vụ cho lúa vụ Xuân năm 2024

Hiện nay lúa vụ Xuân đang giai đoạn kết thúc quá trình trổ bông và đang trong giai đoạn chín sữa, chín sấp một số diện tích chín hoàn toàn, dự kiến thời gian thu hoạch rộ từ 10-15/5/2024; Qua kiểm tra thăm đồng của ban Nông nghiệp xã Ích Hậu, rầy nâu và rầy lưng trắng đã xuất hiện và gây hại ở một số vùng như: vùng Cựa nương, Kẹ Đập... thôn Ích Mỹ; vùng Nhà bạn, Bồng sơn, Đồng cựa... thôn Thống Nhất; vùng Bãi meo Đò lửa, vùng trộ bông... thôn Lương Trung; vùng Nương mây, Vực rí, Đồng nha, Bại nậy... thôn Phù Ích; Vùng Đập mới, Làng lê... thôn Bắc Kinh, với mật độ rầy trung bình từ 700 - 1.000 con/m², cục bộ tại vùng Bồng Sơn, vùng Nương mây mật độ rầy rất cao từ 8.000 - 10.000 con/m² chủ yếu rầy tuổi 4, tuổi 5, rầy trưởng thành và có sự xen gối lứa. Diện tích nhiễm rầy khoảng 1 ha, trong đó nhiễm nặng 0.2 ha, đã có diện tích cháy rầy cục bộ.

Để kịp thời có các giải pháp chăm sóc, hạn chế thấp nhất thiệt hại đến năng suất cây trồng và tổ chức thu hoạch lúa vụ Xuân đạt kết quả cao; UBND xã thông báo đến các thôn và toàn thể bà con nhân dân tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các thôn cần thông báo để bà con biết diễn biến tình hình rầy nâu cuối vụ sản xuất, bà con thường xuyên kiểm tra thăm đồng, nếu phát hiện rầy nâu hại nặng, mật độ rầy cao trên ruộng lúa đã chín được trên 80%, bà con cần tiến hành tổ chức thu hoạch sớm, nhanh gọn để chạy rầy. Đặc biệt đối với các hộ có diện tích tại vùng hạ nương Mây thôn Phù Ích, hiện nay các diện tích lúa bị nhiễm rầy đã chín trên 80% cần đẩy nhanh thu hoạch và tổ chức khoanh vùng tiêu diệt rầy nâu, tránh lây lan sang vụ Hè thu, và tuyệt đối không nên sử dụng thuốc BVTV phun vào giai đoạn lúa đã chín này.

2. Đối với các diện tích lúa mới trổ, chưa chín: Khi phát hiện rầy nâu, rầy lưng trắng với mật độ cao (> 750 con/m²) cần tổ chức phòng trừ bằng các bước như sau:

- Giữ nước trong ruộng, nếu ruộng cạn thì cho nước vào từ 10-15 cm; rẽ lúa thành băng, rộng 50-70 cm.

- Sử dụng các loại thuốc hóa học đặc hiệu như: Basa 50Ec, Victory 585 EC... phun khi rầy ở tuổi 1, tuổi 2.

+ Đối với thuốc Basa 50EC: Pha 25-30 ml thuốc cho 1 bình 8-10 lít nước, phun 3-5 bình trên 1 sào 500m².

+ Đối với thuốc Victory 585EC: Pha 15-20 ml thuốc cho 1 bình 8-10 lít nước, phun 3-4 bình trên 1 sào 500m².

Lưu ý khi phun thuốc:

- Phun bằng vòi 1 béc; phun ướt đảm đều thân lá cây lúa, xịt thẳng thuốc vào phần thân, gốc nơi rầy cư trú.

- Nếu lúa đang ở giai đoạn trổ bông, để tránh ảnh hưởng đến quá trình phơi màu, bà con nên phun trước 8 giờ sáng, và sau 4 giờ chiều.

- Sau khi phun thuốc 5-7 ngày cần kiểm tra, nếu mật độ rầy trên ruộng còn cao thì phải tiến hành phun lại.

3. Các đồng chí thôn trưởng thôn thường xuyên kiểm tra thăm đồng để tổ chức bơm nước một cách đầy đủ cho các vùng diện tích lúa chưa trổ hết, tuyệt đối không được để thiếu nước trong giai đoạn lúa trổ bông, chín sữa.

Nhận được thông báo yêu cầu các đơn vị thôn xóm và bà con nhân dân tổ chức thực hiện tốt nội dung thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Ban Nông nghiệp;
- Ban văn hóa (tuyên truyền);
- Các thôn trưởng;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Bùi Trọng Đĩnh