

Số: /TB-UBND

Ích Hậu, ngày tháng 02 năm 2024

**THÔNG BÁO**  
**Về việc bổ cứu chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh vụ Xuân 2024**

Qua kiểm tra thăm đồng của ban Nông nghiệp xã Ích Hậu, hiện nay các trà lúa gieo thẳng giai đoạn mũi chông đến 3 lá, các diện tích lúa xuống cấy đã bén rễ hồi xanh. Thời gian qua do thời tiết rét nên mạ, lúa gieo thẳng có hiện tượng vàng lá, chết rải rác. Một số diện tích lúa gieo, lúa cấy bị cạn nước. Chuột phá hoại nhiều, nhất là lúa gieo thẳng, ốc bươu vàng gây hại cục bộ trên một số đồng sâu trũng, rệp, bọ trĩ gây hại rải rác trên lúa gieo.

Để đảm bảo an toàn cho sản xuất, đảm bảo diện tích sản xuất đạt kế hoạch, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến bà con nhân dân một số nội dung sau:

**1. Công tác sản xuất:**

Bà con nhân dân kiểm tra tình hình sinh trưởng của lúa khi thời tiết nắng ấm, bón thúc kịp thời sau khi cây lúa bén rễ hồi xanh bắt đầu đẻ nhánh kết hợp đạm urê và kali hoặc bón phân tổng hợp NPK 16-16-8. Trong điều kiện rét heo cần đảm bảo nước tưới cho lúa mới cấy tránh khô lá, những diện tích lúa gieo đã có 2-3 lá cho nước lấp xấp vào mặt ruộng để lúa phát triển thuận lợi, không để khô cạn nứt nẻ cỏ mọc, không để ngập nước chết lúa.

**2. Công tác bảo vệ thực vật:**

\* *Rệp, bọ trĩ*: Lưu ý những diện tích lúa gieo thẳng đã có trên 3 lá, những ruộng lúa cấy muộn. Sử dụng các loại thuốc như: Sutin 5EC, Miretox 10WG, Anvado 100WG... Những diện tích lúa sinh trưởng kém có thể kết hợp thêm các loại phân bón lá có hàm lượng lân cao, kích thích ra rễ, ra nhánh như: Lân xanh, Siêu lân, Siêu ra rễ, Đầu trâu 502...

\* *Tuyến trùng*: Trên những diện tích lúa gieo thẳng thiếu nước, đất cát pha, đất nhiễm phèn thường bị tuyến trùng gây hại ngay từ đầu vụ. Triệu chứng điển hình là rễ lúa nổi u, cục, cây lúa sinh trưởng kém, vàng, chết rải rác. Giữ nước 2-3cm liên tục 5-7 ngày. Những diện tích nhiễm nặng sử dụng các loại thuốc như: Padan 95SP, Patox 95SP...

\* *Bệnh đạo ôn*: Phun phòng cho mạ trước khi xuống cấy 7 ngày, thường xuyên theo dõi đồng ruộng để kịp thời phát hiện bệnh. Sử dụng các loại thuốc

như: Filia 525SE, Beam 75WP, Ninja 35EC, Fujione 40WP phun khi bệnh mới chớm.

\* *Ốc bươu vàng*: Lưu ý đối với những đồng sâu trũng, những ruộng có nước thường xuyên, nếu mật độ ốc thấp áp dụng các biện pháp bắt diệt thủ công, mật độ ốc cao thì sử dụng các loại thuốc như: Black Carp 750WP, StarPumper 800WP, Catfish 70WP, Passport 180GR...pha nước phun hoặc trộn cát rải.

\* *Chuột*: Áp dụng kết hợp các biện pháp diệt chuột thủ công, bẫy, bả sinh học...diệt chuột liên tục để hạn chế số lượng chuột ngay từ đầu vụ.

Nhận được thông báo này yêu cầu các thôn và toàn thể nhân dân nghiêm túc thực hiện./.

***Nơi nhận:***

- Các thôn trưởng;
- Ban Nông nghiệp;
- Ban Văn hóa (tuyên truyền);
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN**  
**KT. CHỦ TỊCH**  
**PHÓ CHỦ TỊCH**

**Bùi Trọng Đĩnh**