

Số: /TB-UBND

Ích Hậu, ngày tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO
Về việc bổ cứu sản xuất lúa vụ Hè thu năm 2024

Hiện nay lúa vụ Hè thu trên địa bàn xã đang giai đoạn làm đòng trở bông, diện tích trở ước đạt 40-50%, bên cạnh sự sinh trưởng phát triển của lúa, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kiểm tra thăm đồng của Ban Nông nghiệp xã, các đối tượng chính trên đồng ruộng hiện nay là sâu cuốn lá lúa 3, khô vằn, sâu đục thân... Bên cạnh đó, do điều kiện nắng hạn, mưa lớn từ đầu vụ ảnh hưởng đến hiệu lực của các loại thuốc diệt cỏ nên trên đồng ruộng cỏ lồng vực (cỏ mỳ, cỏ vác), cỏ đuôi phụng mọc nhiều. Để chủ động phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại lúa Hè thu, Ủy ban nhân dân xã đề nghị các thôn và bà con nhân dân triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa:

* *Đối với sâu cuốn lá:* Dự báo sâu cuốn lá lúa 3 sẽ xuất hiện vào khoảng 30/7 - 5/8, có thể gây nặng vào khoảng 15 - 20/8 ảnh hưởng bộ lá công năng, lá đòng, nhất là những diện tích lúa trở muộn, gây hại giai đoạn lúa làm đòng, ảnh hưởng đến sự phát triển và năng suất lúa Hè Thu. Bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu cuốn lá nhỏ, nếu mật độ sâu cao thì phải tiến hành phun thuốc phòng trừ, sử dụng một trong các loại thuốc sau:

+ Obaone 95WG: Pha 10g thuốc vào 20 lít nước phun cho 1 sào.

+ Clever 150SC: Pha 9ml thuốc trong 20 lít nước phun cho 1 sào.

+ Angun 5WG: Pha 10g thuốc vào 20 lít nước phun cho 1 sào.

Phun thuốc kịp thời khi sâu tuổi nhỏ, mới cuốn lá, không phá tổ sâu gây tổn thương bộ lá, pha thuốc đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, phun thuốc vào buổi chiều tối.

* *Đối với khô vằn:* tiến hành phun phòng, nhất là những diện tích cây dày, lúa xanh tốt có biểu hiện thừa đạm, sử dụng các loại thuốc: Tilt super 300ND, Anvil 5SC, Vida 5 WP...

* *Đối với sâu đục thân:* Trên những ruộng lúa có bướm sâu đục thân mật độ cao thì bà con cần tiến hành phun thuốc sau thời điểm phát hiện bướm rộ bằng các loại thuốc sau:

- Regent 800WG: Pha 3,2g thuốc trong 16 lít nước phun cho 1 sào.
 - Vitako 40WG: Pha 3g thuốc trong 16 lít nước phun cho 1 sào.
- Pha đúng nồng độ liều lượng, phun thuốc vào cuối buổi chiều.

2. Đối với cỏ lồng vực trên lúa Hè Thu: Bà con nhân dân xử lý kịp thời bằng biện pháp thủ công; Sử dụng liềm, dao cắt sát rễ thu gom cả thân, gốc, bông cỏ đưa ra xa ruộng sản xuất, phơi khô rồi đốt. Không vớt cỏ trên bờ ruộng hoặc làm thức ăn, chất độn chuồng gia súc, gia cầm để ngăn ngừa hạt cỏ rơi xuống ruộng hoặc theo phân chuồng bón ra ruộng gây hại cho vụ sau.

3. Các thôn cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, để tiến hành bơm nước kịp thời và tiết kiệm nhất cho lúa. Điều hành, đôn đốc bộ phận dẫn nước và thông báo để bà con nông dân đắp bờ giữ nước, tránh để mất nước cho lúa bước vào giai đoạn trổ bông.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị thôn và bà con nhân dân tổ chức thực hiện tốt nội dung thông báo./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch; các PCT UBND xã;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Ban Nông nghiệp; Ban Văn hóa (tuyên truyền);
- Các thôn trưởng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Trọng Đĩnh