

Số: /TB-UBND

Ích Hậu, ngày tháng 7 năm 2024

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bón thúc đòng cho lúa và phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa vụ Hè thu năm 2024

Hiện nay, lúa vụ Hè thu đã được từ 40-45 ngày tuổi, sinh trưởng và phát triển rất tốt, đây là thời điểm thích hợp để bón thúc đòng cho lúa. Bên cạnh sự sinh trưởng phát triển của lúa, các đối tượng sâu bệnh phát sinh gây hại. Qua kiểm tra thăm đồng của Ban Nông nghiệp xã, các đối tượng chính trên đồng ruộng hiện nay là chuột hại, sâu cuốn lá lúa 3, rầy lưng trắng, sâu đục thân... Để chủ động bón thúc đòng cho lúa cũng như phòng trừ kịp thời, hiệu quả các đối tượng sâu bệnh hại lúa Hè thu, Ủy ban nhân dân xã thông báo đến các thôn và bà con nhân dân triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Bón thúc đòng cho lúa Hè thu:

- Bà con nhân dân cần tiến hành bón thúc đòng cho lúa vụ Hè thu thời gian thích hợp từ ngày 04-07/7/2024, tùy vào chân ruộng của các hộ gia đình cũng như màu sắc lá lúa để bón, lượng phân bón thích hợp cho một sào giai đoạn này là 3kg đạm Ure, 5kg Kali. Nếu ruộng lúa có màu xanh đậm thì hạn chế bón đạm, tăng lượng phân kali.

- Các thôn cần tăng cường kiểm tra đồng ruộng, để tiến hành bơm nước kịp thời và tiết kiệm nhất cho lúa Hè thu. Điều hành, đôn đốc bộ phận dẫn nước và thông báo để bà con nông dân đắp bờ giữ nước, tránh để mất nước trong giai đoạn lúa bước vào giai đoạn đứng cái làm đòng.

2. Phòng trừ các đối tượng sâu bệnh hại lúa:

* *Đối với chuột hại:* Hiện nay, chuột đã phá hại rất lớn trên các diện tích lúa Hè thu, các thôn cần phát động tổ chức diệt chuột thường xuyên bằng thuốc sinh học và phát động bà con dùng bẫy cơ học để đánh bắt thủ công bằng các loại mồi như: cua đồng, cá... để diệt chuột hiệu quả, không ảnh hưởng đến sản xuất và môi trường xung quanh.

* *Đối với sâu cuốn lá:* Dự báo sâu cuốn lá lúa 3 sẽ xuất hiện vào khoảng 31/6 - 5/7, gây hại mạnh vào khoảng ngày 15 - 20/7 ở giai đoạn lúa cuối đé nhánh - phân hoá đòng, có nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lúa Hè Thu. Bà con thường xuyên kiểm tra đồng ruộng để kịp thời phát hiện sâu cuốn lá nhỏ, nếu mật độ sâu cao thì phải tiến hành phun thuốc phòng trừ, sử dụng một trong các loại thuốc sau:

- + Obaone 95WG: Pha 10g thuốc vào 20 lít nước phun cho 1 sào.
- + Clever 150SC: Pha 9ml thuốc trong 20 lít nước phun cho 1 sào.
- + Angun 5WG: Pha 10g thuốc vào 20 lít nước phun cho 1 sào.

Phun thuốc kịp thời khi sâu tuổi nhỏ, mới cuốn lá, không phá tổ sâu gây tổn thương bộ lá, pha thuốc đúng nồng độ, liều lượng theo hướng dẫn trên bao bì, phun thuốc vào buổi chiều tối.

* *Đối với sâu đục thân:* Cách phát hiện: Bướm sâu đục thân 2 chấm có màu vàng rom hoặc trắng, giữa mỗi cánh trước có 1 chấm đen nhỏ, thân dài khoảng 1.5 cm, thường đậu trên lá lúa nên dễ phát hiện. Trứng sâu đẻ thành ổ ở mặt trên lá lúa, phía trên có phủ một lớp lông màu vàng nâu. Sau khi nở sâu non phân tán và đục vào thân lúa gây dẫn héo, bông bạc làm giảm năng suất.

Cách phòng trừ: kiểm tra đồng ruộng, phát hiện cắt bỏ tiêu hủy ổ trứng, dẫn héo; duy trì nước 4 - 5 cm để hạn chế sâu đục xuống gốc lúa. Trên những ruộng lúa có bướm sâu đục thân mật độ cao thì bà con cần tiến hành phun thuốc sau thời điểm phát hiện bướm rộ bằng các loại thuốc sau:

- Regent 800WG: Pha 3,2g thuốc trong 16 lít nước phun cho 1 sào.
- Vitako 40WG: Pha 3g thuốc trong 16 lít nước phun cho 1 sào.

Pha đúng nồng độ liều lượng, phun thuốc vào cuối buổi chiều.

Nhận được thông báo này, yêu cầu các đơn vị thôn và bà con nhân dân tổ chức thực hiện tốt nội dung thông báo./.

Nơi nhận:

- Thường trực Đảng ủy; TT HĐND xã;
- UBMTTQ xã;
- Các tổ chức đoàn thể;
- Ban Văn hóa (tuyên truyền);
- Các thôn trưởng;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Bùi Trọng Đĩnh